

## IQM Qualitätsindikatoren

### HERZERKRANKUNGEN

#### HERZINFARKT

Todesfälle bei Hauptdiagnose Herzinfarkt  
Alle Patienten > 19 Jahre

< Erwartungswert<sub>1</sub>

9,4%  
1701 von 18088

8,6%  
46 von 532

11,3%  
55 von 486

9,9%  
1,14

Alter 20 - 44 Jahre

< Erwartungswert

2,8%  
22 von 798

0,00%  
0 von 21

4,2%  
1 von 24

3,0%  
1,37

Alter 45 - 64 Jahre

< Erwartungswert

4,3%  
237 von 5473

4,1%  
7 von 169

7,4%  
11 von 148

4,6%  
1,62

Alter 65 - 84 Jahre

< Erwartungswert

10,5%  
1051 von 9970

9,9%  
30 von 303

11,4%  
31 von 271

11,5%  
1

Alter > 84 Jahre

< Erwartungswert

21,2%  
391 von 1847

23,1%  
9 von 39

27,9%  
12 von 43

22,5%  
1,24

Todesfälle bei Direktaufnahme ohne Verlegung  
Alle Patienten > 19 Jahre

Beobachtungswert

11,8%  
1527 von 12990

9,6%  
42 von 440

13,1%  
52 von 397

#### HERZINSUFFIZIENZ

Todesfälle bei Hauptdiagnose Herzinsuffizienz  
Alle Patienten > 19 Jahre

< Erwartungswert<sub>1</sub>

8,4%  
2679 von 32053

8,0%  
32 von 402

7,9%  
37 von 466

9,8%  
0,81

Alter 20 - 44 Jahre

< Erwartungswert

2,8%  
10 von 355

0,00%  
0 von 3

0,00%  
0 von 4

2,6%  
0

Alter 45 - 64 Jahre

< Erwartungswert

3,8%  
153 von 3995

0,00%  
0 von 39

5,4%  
3 von 55

4,0%  
1,35

Alter 65 - 84 Jahre	< Erwartungswert	7,3% 1506 von 20666	7,9% 22 von 278	7,2% 22 von 307	8,7% 0,82
Alter > 84 Jahre	< Erwartungswert	14,4% 1010 von 7037	12,2% 10 von 82	12,0% 12 von 100	16,4% 0,73
<b>LINKSHERZKATHETER</b>					
Anzahl aller Linksherzkatheter zur Koronardiagnostik	Mengeninfo	68687	1665	1560	
Todesfälle bei Linksherzkatheter MIT Infarkt <small>Alle Patienten &gt; 19 Jahre</small>	< Erwartungswert <sub>1</sub>	5,6% 703 von 12433	4,6% 21 von 458	4,6% 19 von 410	9,1% 0,51
Todesfälle bei Linksherzkatheter OHNE Infarkt <small>Alle Patienten &gt; 19 Jahre</small>	< 0,5% <sub>2</sub>	1,2% 621 von 53761	0,33% 4 von 1207	0,43% 5 von 1150	
<b>SCHRITTMACHER ODER IMPLANTIERBARER DEFIBRILLATOR</b>					
Schrittmacherversorgung (inkl. Defibrillatoren)	Mengeninfo	12139	240	311	

Die Quelle gibt an, an welcher Stelle Vergleichswerte des jeweiligen Indikators zu finden sind.

1 Statistisches Bundesamt 2007

2 HELIOS Qualitätsbericht 2008

3 BQS Mittelwerte der Bundesauswertung 2008

4 Literatur zur Routedatenmessung

Der Erwartungswert beinhaltet die erwartete Sterblichkeit unserer Patienten aufgrund ihrer Alters- und Geschlechtsverteilung und ist nur bei den Indikatoren angegeben, bei denen Vergleichszahlen des Bundesdurchschnitts die Berechnung erlauben.

## IQM Qualitätsindikatoren

### SCHLAGANFALL

	IQM-Zielwert Quelle	IQM- Durchschnittswert Fallzahl	2008 Klinik-Istwert Fallzahl	2009 Klinik-Istwert Fallzahl	Klinik- Erwartungswert SMR
<b>Todesfälle bei Hauptdiagnose Schlaganfall</b> <small>alle Formen des Schlaganfalls, Alter &gt; 19 Jahre</small>	< Erwartungswert 1	9,2% 2125 von 23119	5,9% 18 von 306	8,7% 26 von 298	9,9% 0,88
Alter 20 - 44 Jahre	< Erwartungswert	3,4% 24 von 708	0,00% 0 von 6	0,00% 0 von 7	3,4% 0
Alter 45 - 64 Jahre	< Erwartungswert	4,8% 219 von 4520	1,9% 1 von 52	4,0% 2 von 50	4,4% 0,9
Alter 65 bis 84 Jahre	< Erwartungswert	8,7% 1227 von 14035	6,5% 13 von 200	7,1% 14 von 198	9,8% 0,73
Alter > 84 Jahre	< Erwartungswert	17,0% 655 von 3856	8,3% 4 von 48	23,3% 10 von 43	17,8% 1,3
<b>Todesfälle bei Hirninfarkt</b> <small>ICD I63, Alter &gt; 19 Jahre</small>	< Erwartungswert 1	6,9% 1333 von 19364	4,9% 13 von 267	7,3% 20 von 275	7,6% 0,96
<b>Todesfälle bei Hirnblutungen</b> <small>ICD I61, Alter &gt; 19 Jahre</small>	Beobachtungswert	23,1% 729 von 3161	11,8% 4 von 34	26,1% 6 von 23	
<b>Todesfälle bei nicht näher bezeichnetem Schlaganfall</b> <small>ICD I64, Alter &gt; 19 Jahre</small>	Beobachtungswert	10,6% 63 von 594	20,0% 1 von 5		
<b>Anteil nicht näher bezeichneter Schlaganfall</b> <small>ICD I64, Alter &gt; 19 Jahre</small>	< 5% 2	2,6% 594 von 23119	1,6% 5 von 306	0,00% 0 von 298	

Die Quelle gibt an, an welcher Stelle Vergleichswerte des jeweiligen Indikators zu finden sind.

1 Statistisches Bundesamt 2007

2 HELIOS Qualitätsbericht 2008

Der Erwartungswert beinhaltet die erwartete Sterblichkeit unserer Patienten aufgrund ihrer Alters- und Geschlechtsverteilung und ist nur bei den Indikatoren angegeben, bei denen Vergleichszahlen des Bundesdurchschnitts die Berechnung erlauben.



3 BQS Mittelwerte der Bundesauswertung 2008  
4 Literatur zur Routinedatenmessung

## IQM Qualitätsindikatoren

### LUNGENERKRANKUNGEN

#### ■ LUNGENERKRANKUNGEN

Todesfälle bei Hauptdiagnose Lungenentzündung  
alle Altersgruppen

< Erwartungswert<sup>1</sup>

9,3%  
2105 von 22554

14,5%  
34 von 235

15,0%  
49 von 327

12,6%  
1,19

Alter 15 - 44 Jahre

< Erwartungswert

1,4%  
23 von 1651

0,00%  
0 von 16

4,2%  
1 von 24

1,4%  
2,98

Alter 45 - 64 Jahre

< Erwartungswert

5,8%  
202 von 3474

4,6%  
2 von 43

11,9%  
8 von 67

6,9%  
1,74

Alter 65 - 84 Jahre

< Erwartungswert

11,8%  
1207 von 10188

13,8%  
18 von 130

14,8%  
27 von 182

13,6%  
1,09

Alter > 84 Jahre

< Erwartungswert

19,3%  
663 von 3434

30,4%  
14 von 46

24,1%  
13 von 54

21,0%  
1,15

#### ■ LUNGENKREBS

Stationäre Fälle mit Lungenkrebs

Mengeninfo

33579

145

195

Die Quelle gibt an, an welcher Stelle Vergleichswerte des jeweiligen Indikators zu finden sind.

1 Statistisches Bundesamt 2007

2 HELIOS Qualitätsbericht 2008

3 BQS Mittelwerte der Bundesauswertung 2008

4 Literatur zur Routinedatenmessung

Der Erwartungswert beinhaltet die erwartete Sterblichkeit unserer Patienten aufgrund ihrer Alters- und Geschlechtsverteilung und ist nur bei den Indikatoren angegeben, bei denen Vergleichszahlen des Bundesdurchschnitts die Berechnung erlauben.

## IQM Qualitätsindikatoren

### ENTFERNUNG DER GALLENBLASE

	IQM-Zielwert Quelle	IQM- Durchschnittswert Fallzahl	2008 Klinik-Istwert Fallzahl	2009 Klinik-Istwert Fallzahl	Klinik- Erwartungswert SMR
Anteil laparoskopische OP	> 90% 2	91,8% 11473 von 12504	90,0% 179 von 199	92,2% 189 von 205	
Anteil Umsteiger auf offene OP	Beobachtungs- ungswert	3,6% 447 von 12504	7,5% 15 von 199	5,8% 12 von 205	
Anteil Todesfälle bei Entfernung der Gallenblase OP bei Gallenstein	< 0,4% 4	0,40% 50 von 12504	0,00% 0 von 199	0,00% 0 von 205	

Die Quelle gibt an, an welcher Stelle Vergleichswerte des jeweiligen Indikators zu finden sind.

1 Statistisches Bundesamt 2007

2 HELIOS Qualitätsbericht 2008

3 BQS Mittelwerte der Bundesauswertung 2008

4 Literatur zur Routinedatenmessung

Der Erwartungswert beinhaltet die erwartete Sterblichkeit unserer Patienten aufgrund ihrer Alters- und Geschlechtsverteilung und ist nur bei den Indikatoren angegeben, bei denen Vergleichszahlen des Bundesdurchschnitts die Berechnung erlauben.

## IQM Qualitätsindikatoren

### OPERATION VON LEISTEN-, SCHENKEL- UND NABELBRÜCHEN

	IQM-Zielwert Quelle	IQM- Durchschnittswert Fallzahl	2008 Klinik-Istwert Fallzahl	2009 Klinik-Istwert Fallzahl	Klinik- Erwartungswert SMR
Todesfälle bei Bruchoperationen ohne Darmresektion	< 0,12% 4	0,15% 30 von 19871	0,52% 1 von 191	0,00% 0 von 164	

Die Quelle gibt an, an welcher Stelle Vergleichswerte des jeweiligen Indikators zu finden sind.

- 1 Statistisches Bundesamt 2007
- 2 HELIOS Qualitätsbericht 2008
- 3 BQS Mittelwerte der Bundesauswertung 2008
- 4 Literatur zur Routinedatenmessung

Der Erwartungswert beinhaltet die erwartete Sterblichkeit unserer Patienten aufgrund ihrer Alters- und Geschlechtsverteilung und ist nur bei den Indikatoren angegeben, bei denen Vergleichszahlen des Bundesdurchschnitts die Berechnung erlauben.

## IQM Qualitätsindikatoren

## GROSSE OPERATIONEN DES VERDAUUNGSTRAKTES

	IQM-Zielwert Quelle	IQM- Durchschnittswert Fallzahl	2008 Klinik-Istwert Fallzahl	2009 Klinik-Istwert Fallzahl	Klinik- Erwartungswert SMR
Todesfälle bei Dickdarmresektion bei Karzinom (Krebs) <small>ohne komplizierende Diagnose</small>	< 6% 4	4,4% 100 von 2274	3,2% 1 von 31	13,6% 3 von 22	
Todesfälle bei Kolonresektionen <small>OP bei Krebs, mit komplizierender Diagnose</small>	Beobachtungswert	14,1% 84 von 594	33,3% 2 von 6	9,1% 1 von 11	
Todesfälle bei Enddarmresektionen bei Karzinom <small>ohne komplizierende Diagnose</small>	< 6% 4	3,3% 69 von 2099	0,00% 0 von 39	2,6% 1 von 38	
Todesfälle bei Dick- und Enddarmresektionen bei Divertikel <small>ohne Abzeß oder Perforation</small>	< 2% 2	1,1% 14 von 1275	0,00% 0 von 8	0,00% 0 von 17	
Todesfälle bei kolorektalen Resektionen <small>OP bei Divertikel mit Abzeß oder Perforation</small>	Beobachtungswert	6,2% 74 von 1195	5,3% 1 von 19	0,00% 0 von 18	
Anzahl kolorektaler Resektionen bei anderer Diagnose	Mengeninfo	3769	48	39	
Zusätzliche, ausschließlich lokale kolorektale Eingriffe <small>OP bei Krebs</small>	Mengeninfo	690	14	14	
Zusätzliche, ausschließlich lokale kolorektale Eingriffe <small>OP nicht bei Krebs</small>	Mengeninfo	10550	234	230	
Todesfälle kolorektale Resektionen insgesamt	Beobachtungswert	7,6% 846 von 11206	4,6% 7 von 151	6,2% 9 von 145	



Todesfälle bei Pankreasresektionen

Alle Patienten > 19 Jahre

Beobachtungs-  
ungswert

8,4%  
112 von 1341

7,1%  
1 von 14

11,1%  
2 von 18

Die Quelle gibt an, an welcher Stelle Vergleichswerte des jeweiligen Indikators zu finden sind.

- 1 Statistisches Bundesamt 2007
- 2 HELIOS Qualitätsbericht 2008
- 3 BQS Mittelwerte der Bundesauswertung 2008
- 4 Literatur zur Routedatenmessung

Der Erwartungswert beinhaltet die erwartete Sterblichkeit unserer Patienten aufgrund ihrer Alters- und Geschlechtsverteilung und ist nur bei den Indikatoren angegeben, bei denen Vergleichszahlen des Bundesdurchschnitts die Berechnung erlauben.

## IQM Qualitätsindikatoren

### GEFÄSSOPERATIONEN

	IQM-Zielwert Quelle	IQM- Durchschnittswert Fallzahl	2008 Klinik-Istwert Fallzahl	2009 Klinik-Istwert Fallzahl	Klinik- Erwartungswert SMR
Todesfälle bei Operationen eines Aortenaneurysmas <small>nur abdominelle, nicht rupturierte Aneurysmata, offen operiert</small>	< 5% 4	4,3% 19 von 445	0,00% 0 von 4	0,00% 0 von 2	
Todesfälle bei Operationen der Halsschlagader <small>nur extrakranielle OP</small>	< 2% 4	0,84% 24 von 2851	0,00% 0 von 22	5,6% 2 von 36	
Todesfälle bei Implantation von Stents in die Halsschlagader <small>nur extrakranielle Gefäße</small>	< 2% 2	2,4% 13 von 537	0,00% 0 von 9	0,00% 0 von 6	

Die Quelle gibt an, an welcher Stelle Vergleichswerte des jeweiligen Indikators zu finden sind.

- 1 Statistisches Bundesamt 2007
- 2 HELIOS Qualitätsbericht 2008
- 3 BQS Mittelwerte der Bundesauswertung 2008
- 4 Literatur zur Routinedatenmessung

Der Erwartungswert beinhaltet die erwartete Sterblichkeit unserer Patienten aufgrund ihrer Alters- und Geschlechtsverteilung und ist nur bei den Indikatoren angegeben, bei denen Vergleichszahlen des Bundesdurchschnitts die Berechnung erlauben.

## IQM Qualitätsindikatoren

### GEBURTSHILFE

	IQM-Zielwert Quelle	IQM- Durchschnittswert Fallzahl	2008 Klinik-Istwert Fallzahl	2009 Klinik-Istwert Fallzahl	Klinik- Erwartungswert SMR
Todesfälle der Mütter bei Geburt	< 0,005% 1	0,01% 4 von 52043	0,00% 0 von 596	0,00% 0 von 558	
Anteil Dammriß 3. und 4. Grades	< 1,4% 3	1,3% 479 von 36151	3,6% 18 von 494	0,86% 4 von 464	
Anteil der Mütter mit Dammschnitt	Information	23,2% 8402 von 36151	42,9% 212 von 494	47,0% 218 von 464	
Kaiserschnittrate Anteil an allen Geburten	Information	30,5% 15892 von 52043	17,1% 102 von 596	16,8% 94 von 558	
Anteil sanfter Kaiserschnitt (Misgav-Ladach) Anteil an allen Kaiserschnitt OP	Information	77,4% 12296 von 15892	18,6% 19 von 102	48,9% 46 von 94	

Die Quelle gibt an, an welcher Stelle Vergleichswerte des jeweiligen Indikators zu finden sind.

- 1 Statistisches Bundesamt 2007
- 2 HELIOS Qualitätsbericht 2008
- 3 BQS Mittelwerte der Bundesauswertung 2008
- 4 Literatur zur Routinedatenmessung

Der Erwartungswert beinhaltet die erwartete Sterblichkeit unserer Patienten aufgrund ihrer Alters- und Geschlechtsverteilung und ist nur bei den Indikatoren angegeben, bei denen Vergleichszahlen des Bundesdurchschnitts die Berechnung erlauben.

## IQM Qualitätsindikatoren

### GYNÄKOLOGIE

	IQM-Zielwert Quelle	IQM- Durchschnittswert Fallzahl	2008 Klinik-Istwert Fallzahl	2009 Klinik-Istwert Fallzahl	Klinik- Erwartungswert SMR
Todesfälle bei Entfernung der Gebärmutter bei gutartige Erkrankungen	< 0,014% 2	0,07% 7 von 9351	0,00% 0 von 181	0,00% 0 von 181	
Anteil der vaginal/laparoskopischen OP der Gebärmutter nur OP ohne Plastiken	> 85% 2	79,1% 7314 von 9244	89,0% 161 von 181	89,5% 162 von 181	
Stationäre Fälle wegen Brustkrebs	Mengeninfo	22111	241	339	
Anzahl der Eingriffe an der Brust	Mengeninfo	13400	102	153	

Die Quelle gibt an, an welcher Stelle Vergleichswerte des jeweiligen Indikators zu finden sind.

- 1 Statistisches Bundesamt 2007
- 2 HELIOS Qualitätsbericht 2008
- 3 BQS Mittelwerte der Bundesauswertung 2008
- 4 Literatur zur Routinedatenmessung

Der Erwartungswert beinhaltet die erwartete Sterblichkeit unserer Patienten aufgrund ihrer Alters- und Geschlechtsverteilung und ist nur bei den Indikatoren angegeben, bei denen Vergleichszahlen des Bundesdurchschnitts die Berechnung erlauben.

## IQM Qualitätsindikatoren

### ORTHOPÄDIE UND UNFALLCHIRURGIE

	IQM-Zielwert Quelle	IQM- Durchschnittswert Fallzahl	2008 Klinik-Istwert Fallzahl	2009 Klinik-Istwert Fallzahl	Klinik- Erwartungswert SMR
Todesfälle bei Hüftgelenkersatz (Erstimplantation) nicht bei Fraktur	< 0,20% 3	0,19% 28 von 14991	0,00% 0 von 93	0,00% 0 von 87	
Todesfälle bei Hüftgelenkersatz (Wechsel)	< 1,3% 3	0,92% 25 von 2712	0,00% 0 von 1	0,00% 0 von 10	
Todesfälle bei Kniegelenkersatz (Erstimplantation)	< 0,1% 3	0,11% 15 von 13361	0,00% 0 von 139	0,00% 0 von 208	
Todesfälle bei Kniegelenkersatz (Wechsel)	< 0,16% 3	0,15% 2 von 1353	0,00% 0 von 9	0,00% 0 von 11	
Todesfälle bei Schenkelhalsfraktur alle Altersgruppen	< Erwartungswert 1	5,3% 302 von 5710	2,0% 1 von 51	3,2% 2 von 63	5,1% 0,62
Alter < 60 Jahre	< Erwartungswert	0,96% 6 von 623	0,00% 0 von 8	0,00% 0 von 12	0,91% 0
Alter 60 bis 69 Jahre	< Erwartungswert	1,4% 9 von 625	0,00% 0 von 4	0,00% 0 von 5	1,7% 0
Alter 70 bis 79 Jahre	< Erwartungswert	4,0% 55 von 1379	6,7% 1 von 15	9,1% 1 von 11	3,7% 2,44
Alter 80 bis 84 Jahre	< Erwartungswert	6,3% 75 von 1193	0,00% 0 von 10	0,00% 0 von 15	4,8% 0
Alter 85 bis 89 Jahre	< Erwartungswert	7,2% 91 von 1270	0,00% 0 von 11	0,00% 0 von 15	8,3% 0
Alter > 89 Jahre	< Erwartungswert	10,6% 66 von 620	0,00% 0 von 3	20,0% 1 von 5	13,4% 1,49



## Qualitätsergebnisse Jahr 2009 Klinikum St. Elisabeth Straubing

Die Quelle gibt an, an welcher Stelle Vergleichswerte des jeweiligen Indikators zu finden sind.

- 1 Statistisches Bundesamt 2007
- 2 HELIOS Qualitätsbericht 2008
- 3 BQS Mittelwerte der Bundesauswertung 2008
- 4 Literatur zur Routinedatenmessung

Der Erwartungswert beinhaltet die erwartete Sterblichkeit unserer Patienten aufgrund ihrer Alters- und Geschlechtsverteilung und ist nur bei den Indikatoren angegeben, bei denen Vergleichszahlen des Bundesdurchschnitts die Berechnung erlauben.

## IQM Qualitätsindikatoren

### OPERATIONEN DER NIERE

	IQM-Zielwert Quelle	IQM- Durchschnittswert Fallzahl	2008 Klinik-Istwert Fallzahl	2009 Klinik-Istwert Fallzahl	Klinik- Erwartungswert SMR
Todesfälle bei Totalentfernung der Niere	< 3% 4	2,3% 51 von 2232	0,00% 0 von 30	3,7% 1 von 27	
Anteil laparoskopischer OP bei Totalentfernung der Niere	Information	22,0% 490 von 2232	63,3% 19 von 30	48,2% 13 von 27	
Todesfälle bei Teilentfernung der Niere	< 0,5% 2	0,47% 4 von 856	0,00% 0 von 9	0,00% 0 von 9	
Anteil laparoskopischer OP bei Teilentfernung der Niere	Information	18,7% 160 von 856	11,1% 1 von 9	44,4% 4 von 9	

Die Quelle gibt an, an welcher Stelle Vergleichswerte des jeweiligen Indikators zu finden sind.

1 Statistisches Bundesamt 2007

2 HELIOS Qualitätsbericht 2008

3 BQS Mittelwerte der Bundesauswertung 2008

4 Literatur zur Routinedatenmessung

Der Erwartungswert beinhaltet die erwartete Sterblichkeit unserer Patienten aufgrund ihrer Alters- und Geschlechtsverteilung und ist nur bei den Indikatoren angegeben, bei denen Vergleichszahlen des Bundesdurchschnitts die Berechnung erlauben.

## IQM Qualitätsindikatoren

### OPERATIONEN DER PROSTATA

	IQM-Zielwert Quelle	IQM- Durchschnittswert Fallzahl	2008 Klinik-Istwert Fallzahl	2009 Klinik-Istwert Fallzahl	Klinik- Erwartungswert SMR
Todesfälle bei Operation der Prostata durch die Harnröhre	< 0,2% 2	0,17% 13 von 7442	0,97% 1 von 103	0,00% 0 von 110	
Fälle mit Prostatakarzinom <small>Prostatakarzinom als Haupt- oder Nebendiagnose</small>	Mengeninfo	17109	159	196	
Todesfälle bei radikaler Prostataentfernung	< 0,5% 2	0,09% 3 von 3485	0,00% 0 von 42	0,00% 0 von 51	

Die Quelle gibt an, an welcher Stelle Vergleichswerte des jeweiligen Indikators zu finden sind.

1 Statistisches Bundesamt 2007

2 HELIOS Qualitätsbericht 2008

3 BQS Mittelwerte der Bundesauswertung 2008

4 Literatur zur Routedatenmessung

Der Erwartungswert beinhaltet die erwartete Sterblichkeit unserer Patienten aufgrund ihrer Alters- und Geschlechtsverteilung und ist nur bei den Indikatoren angegeben, bei denen Vergleichszahlen des Bundesdurchschnitts die Berechnung erlauben.

## IQM Qualitätsindikatoren

### INTENSIVMEDIZIN

	IQM-Zielwert Quelle	IQM- Durchschnittswert Fallzahl	2008 Klinik-Istwert Fallzahl	2009 Klinik-Istwert Fallzahl	Klinik- Erwartungswert SMR
<b>Todesfälle bei Beatmung über 24 Stunden</b> <small>Angabe ohne Neugeborene</small>	< 35% <small>2</small>	32,7% <small>7731 von 23624</small>	38,6% <small>78 von 202</small>	34,0% <small>80 von 235</small>	
<b>Todesfälle bei Sepsis</b> <small>Nur Fälle mit der Hauptdiagnose Sepsis</small>	Beobacht- ungswert	21,0% <small>1509 von 7168</small>	17,6% <small>16 von 91</small>	19,2% <small>14 von 73</small>	

Die Quelle gibt an, an welcher Stelle Vergleichswerte des jeweiligen Indikators zu finden sind.

- 1 Statistisches Bundesamt 2007
- 2 HELIOS Qualitätsbericht 2008
- 3 BQS Mittelwerte der Bundesauswertung 2008
- 4 Literatur zur Routedatenmessung

Der Erwartungswert beinhaltet die erwartete Sterblichkeit unserer Patienten aufgrund ihrer Alters- und Geschlechtsverteilung und ist nur bei den Indikatoren angegeben, bei denen Vergleichszahlen des Bundesdurchschnitts die Berechnung erlauben.